КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

Листок-вкладыш - информация для пациента

Акридерм Santo, 0,05 %, крем для наружного применения

Действующее вещество: бетаметазон

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акридерм Santo, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Акридерм Santo.

3. Прием препарата Акридерм Santo.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акридерм Santo.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акридерм Santo и для чего его применяют

Препарат Акридерм Santo содержит действующее вещество бетаметазон, относящееся к группе кортикостероидов, применяемых в дерматологии.

Показания к применению

Лекарственный препарат показан к применению у взрослых, новорожденных, младенцев, детей, подростков в возрасте от 0 до 18 лет.

1. Предпочтительные показания к применению, при которых наружная терапия кортикостероидами является оптимальным методом лечения:

- контактный дерматит;

- атопический дерматит;

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

- лихенизация.

2. Показания к применению, при которых наружная терапия кортикостероидами является одним из стандартных методов лечения:

- варикозный дерматит;

- псориаз (за исключением распространенных высыпаний);

- лишай;

- зуд, не связанный с паразитарными заболеваниями;

- дисгидроз;

- склероатрофический лихен вульвы;

- кольцевидная гранулема;

- дискоидная красная волчанка;

- себорейный дерматит, кроме высыпаний на коже лица;

- симптоматическая терапия зуда при грибовидном микозе.

3. Показания к краткосрочному применению препарата:

- укусы насекомых и зуд, вызванный паразитарными заболеваниями, после окончания этиотропной терапии.

Препарат в форме крема предназначен для лечения мокнущих высыпаний в острой стадии заболевания.

Примечание: для лечения каждого дерматоза следует применять кортикостероид соответствующей степени активности, и, в зависимости от результатов лечения, заменять его на препарат более высокой или низкой степени активности, обрабатывая все высыпания или лишь часть из них.

Способ действия препарата Акридерм Santo

Препарат эффективен при некоторых воспалительных процессах (например, при контактном дерматите) и обусловленном им зуде.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм Santo

Противопоказания

Не применяйте препарат Акридерм Santo:

- если у Вас аллергия на бетаметазон или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;

- если у Вас кожные заболевания, вызванные первичной бактериальной, вирусной, грибковой или паразитарной инфекцией, включая туберкулез;

- периоральный дерматит;

- акне;

- розацеа;

- перианальный и генитальный зуд.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

Акридерм Santo крем не следует применять при кожных высыпаниях, грибковых или бактериальных инфекциях кожи без соответствующей сопутствующей противоинфекционной терапии.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Акридерм Santo проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Местная и системная токсичность часто встречается, особенно при длительном непрерывном применении на обширных участках поврежденной кожи, в области сгибов или с полиэтиленовой окклюзионной повязкой.

Не рекомендуется длительное наружное применение препарата на коже лица, так как возможно развитие розацеа, периорального дерматита и акне. У детей и у больных с поражением кожи лица курс лечения не должен превышать 5 дней. Длительного непрерывного лечения следует избегать у всех пациентов, независимо от возраста.

Применение местных кортикостероидов может быть опасным при псориазе по ряду причин, включая обострения после развития привыкания, риск генерализованного пустулезного псориаза и местную системную токсичность вследствие нарушения барьерной функции кожи. Важно тщательное наблюдение за пациентом.

Общие сведения

Системная абсорбция местных кортикостероидов может вызывать обратимое подавление системы HPA (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) с возможностью развития глюкокортикостероидной недостаточности после отмены лечения. У некоторых пациентов системное всасывание местных кортикостероидов во время лечения также может вызывать проявления синдрома Кушинга. Пациентам, получающим большие дозы сильнодействующего местного стероида, нанесенного на большую площадь поверхности, следует периодически обследоваться на предмет подавления системы HPA. При выявлении подавления системы HPA следует попытаться отменить препарат, сократить частоту применения или заменить его менее активным кортикостероидом.

Восстановление функции системы HPA обычно происходит быстро и полностью после отмены препарата. В редких случаях могут возникать признаки и симптомы отмены стероидов, требующие дополнительного назначения системных кортикостероидов.

Любые побочные эффекты, описанные при системном применении кортикостероидов, включая угнетение функции надпочечников, могут также наблюдаться при применении местных кортикостероидов, особенно у младенцев и детей.

Акридерм Santo не предназначен для офтальмологического применения.

При системном и местном (включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное) применении кортикостероидов могут наблюдаться нарушения зрения. Если у пациента наблюдаются такие симптомы, как затуманенное зрение или другие нарушения зрения, следует рассмотреть

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

возможность направления пациента к офтальмологу для оценки возможных причин нарушений зрения, к которым могут относиться катаракта, глаукома или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР), о которых сообщалось после применения системных и местных кортикостероидов.

Длительное применение топических стероидов может привести к развитию рецидивов после прекращения лечения (синдром отмены топических стероидов). Может развиться тяжелая форма рецидива, которая принимает форму дерматита с интенсивным покраснением, жжением и покалыванием, которые могут распространяться за пределы первоначальной области лечения. Это более вероятно при обработке чувствительных участков кожи, таких как лицо и сгибы. При повторном возникновении заболевания в течение нескольких дней или недель после успешного лечения следует заподозрить реакцию отмены. Повторное применение следует проводить с осторожностью, и в таких случаях рекомендуется консультация специалиста или следует рассмотреть другие варианты лечения.

Дети и подростки

Дети могут быть более восприимчивы к подавлению системы HPA, вызванному местными кортикостероидами, а также к подавлению системы HPA, вызванному экзогенными кортикостероидами, и к экзогенным эффектам кортикостероидов, чем взрослые, из-за большей абсорбции, обусловленной большим соотношением площади поверхности кожи к массе тела. У детей, получающих местные кортикостероиды, наблюдались подавление системы HPA, синдром Кушинга и внутричерепная гипертензия. Проявления подавления функции надпочечников у детей включают линейную задержку роста, задержку набора веса, низкий уровень кортизола в плазме и отсутствие реакции на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Проявления внутричерепной гипертензии включают выбухание родничка, головные боли и двусторонний отек диска зрительного нерва.

Ткань (одежда, постельное белье, перевязочные материалы и т. д.), контактировавшая препаратом, легко воспламеняется и представляет серьезную опасность возгорания. Стирка одежды и постельного белья может уменьшить накопление препарата, но не удалить его полностью.

Другие препараты и препарат Акридерм Santo

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Учитывая наружное применение препарата Акридерм Santo: при применении бетаметазона в рекомендуемых дозах развитие клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными препаратами маловероятно.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

Безопасность наружного применения глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена; назначение лекарственных препаратов этой группы в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. Во время беременности препараты этой группы не следует применять в высоких дозах или длительное время.

Неизвестно, приводит ли местное применение кортикостероидов к системной абсорбции, достаточной для получения определяемых количеств в грудном молоке. Вводимые системно кортикостероиды секретируются с грудным молоком в количествах, которые вряд ли способны оказать вредное воздействие на ребёнка раннего возраста. Тем не менее следует принять решение о прекращении приёма препарата, учитывая важность препарата для матери. Местные кортикостероиды не следует наносить на кожу груди перед кормлением грудью.

Нет данных о влиянии препарата на фертильность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Данных о неблагоприятном воздействии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами не имеется.

Препарат Акридерм Santo содержит метилпарагидроксибензоат

Этот лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат и может вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

Препарат Акридерм Santo содержит пропиленгликоль

Этот лекарственный препарат содержит пропиленгликоль и может раздражать кожу.

3. Прием препарата Акридерм Santo

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат следует наносить на кожу 1–2 раза в сутки. У некоторых пациентов адекватная поддерживающая терапия может быть достигнута при более редком нанесении. Крем Акридерм Santo особенно подходит для влажных или мокнущих поверхностей.

При увеличении количества нанесений препарата в сутки частота нежелательных явлений может возрастать, при этом терапевтический эффект не увеличивается.

При нанесении препарата на обширную поверхность кожи необходимо учитывать количество использованных туб.

Применение у детей

У детей младше 12 лет применять препарат под наблюдением врача.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения.

Рекомендуется наносить небольшое количество препарата на пораженные участки кожи, распределяя его легкими массирующими движениями до полного впитывания.

При некоторых дерматозах (псориаз, атопический дерматит и др.) препарат следует отменять постепенно. Это можно сделать, уменьшая частоту нанесения и/или используя препарат более низкой степени активности, либо содержащий меньшую дозу действующего вещества.

Если вы применили препарат Акридерм Santo больше, чем следовало

Симптомы: Чрезмерное или длительное применение местных кортикостероидов может вызвать угнетение функции гипофизарно-надпочечниковой системы и привести к развитию вторичной недостаточности коры надпочечников и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Кушинга.

Лечение: Показано соответствующее симптоматическое лечение. Острые симптомы гиперкортицизма обычно обратимы. При необходимости следует корректировать электролитные нарушения. При хроническом токсическом действии рекомендуется постепенная отмена кортикостероидов.

Если Вы прекратили прием препарата Акридерм Santo
При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Акридерм Santo:

Очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000

- реакции гиперчувствительности кожи (зуд, жжение, боль);

- аллергический контактный дерматит;

- крапивница;

- вторичное инфицирование ран (особенно под окклюзионной повязкой или в складках кожи);

- синдром Кушинга;

- задержка роста;

- острая надпочечниковая недостаточность;

- сухость кожи;

- атрофия кожи;

- телеангиэктазии (особенно на коже лица);

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

- стрии (в частности, на коже проксимальных отделов конечностей, чаще возникают у подростков);

- экхимоз;

- пероральный дерматит;

- розацеа (усугубление проявлений);

- замедление заживления вялотекущих ран, пролежней, язв голеней;

- угревая или пустулезная сыпь;

- изменение пигментации кожи;

- гипертрихоз.

Неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно

- размытое зрение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13
БЦ «Нурсаулет 2»
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Адрес электронной почты: pdlc@dari.kz
Сайт: http://www.ndda.kz

5. Хранение препарата Акридерм Santo

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С.

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если вы заметили видимые признаки непригодности препарата для применения.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акридерм Santo содержит

Действующим веществом препарата является бетаметазон.

Каждые 100 г крема содержат бетаметазона дипропионат (бетаметазона дипропионат микронизированный) 0,064 г в пересчете на 100 % вещество, что эквивалентно 0,05 г бетаметазона.

Прочими ингридиентами (вспомогательными веществами) являются: метилпарагидроксибензоат (нипагин), парафин твердый, вазелин, пропиленгликоль, парафин жидкий (вазелиновое масло), воск эмульсионный, динатрия эдетат (трилон Б), натрия сульфит безводный, вода очищенная.

Внешний вид препарата Акридерм Santo и содержимое упаковки

Крем белого или почти белого цвета.

По 15 г или 30 г препарата помещают в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов.

По 1 тубе вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-51
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz

Производитель
Россия
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-50
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz; phv@santo.kz

Прочие источники информации

КМФК МЗ РК
ЛП-№015402-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
14.07.2026

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.