КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Листок-вкладыш - информация для пациента

Акридерм ДУО, 0,05 %+0,1 %, мазь для наружного применения

Действующие вещества: бетаметазон + гентамицин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акридерм ДУО, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм ДУО.

3. Применение препарата Акридерм ДУО.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акридерм ДУО.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акридерм ДУО и для чего его применяют

Препарат Акридерм ДУО содержит действующие вещества бетаметазон и гентамицин, относится к фармакотерапевтической группе кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с антибиотиками.

Показания к применению

Мазь показана для местного лечения вторично инфицированных дерматозов, вызванных чувствительными к гентамицину бактериями или при подозрении на такие инфекции, включая контактный дерматит (дерматит ядовитый), атопический дерматит (детская экзема, аллергический дерматит), нейродермит (простой хронический лишай), красный плоский лишай, экзему (включая монетовидную экзему, экзему кистей рук, экзематозный дерматит), опрелость,

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

дисгидроз (помфоликс), себорейный дерматит, эксфолиативный дерматит, застойный дерматит.

Способ действия препарата Акридерм ДУО

Препарат Акридерм ДУО содержит глюкокортикостероид – бетаметазона дипропионат и антибактериальное вещество – гентамицин, которые в комбинации оказывают противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное и антибактериальное действие.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм ДУО

Противопоказания

Не применяйте препарат Акридерм ДУО:

- если у Вас аллергия на бетаметазон, гентамицин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), а также если у Вас аллергия на другие глюкокортикостероиды или аминогликозидные антибиотики (перекрестная аллергия с гентамицином);
- при кожных заболеваниях, вызванных первичной бактериальной или вирусной инфекцией;
- если у Вас вирусные инфекции кожи, включая ветряную оспу;
- если у Вас поствакцинальные реакции;
- если у Вас туберкулез кожи;
- если у Вас кожные проявления сифилиса;
- если у Вас вирусные инфекции кожи (простой герпес, опоясывающий лишай);
- если у Вас есть высыпания в области щек, обусловленное стойким расширением мелких сосудов (розацеа и розацеаподобный дерматит);
- если у Вас заболевание кожи, вызванное грибком (дерматомикозы);
- если Вы применяете аминогликозидные антибиотики системного действия (при одновременном применении с Акридерм ДУО по причине риска развития токсичных реакций);
- если у Вас прогрессирующая почечная недостаточность;
- если Вашему ребенку еще не исполнилось 2 года.

Препарат Акридерм ДУО не следует применять в области глаз и на слизистых оболочках.

Препарат Акридерм ДУО не следует применять в области слухового канала.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Из-за возможности абсорбции активного вещества следует избегать длительного лечения, нанесения на обширные участки кожи и/или лечения с использованием окклюзионных повязок.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Акридерм ДУО проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Акридерм ДУО следует применять с осторожностью, поскольку в его состав входит антибиотик - гентамицин. Следует избегать применения препарата, когда антибиотикотерапия противопоказана.

Необходимо проявлять осторожность при нанесении данного препарата на кожу лица.

Следует избегать долгосрочной непрерывной терапии или применения препарата на большой кожной поверхности ввиду возможности всасывания препарата в системный кровоток.

Системные побочные эффекты, которые регистрировались после системной абсорбции препарата, включая признаки подавления функции надпочечников, также могут развиться при использовании местно применяемых кортикостероидов, особенно у младенцев и детей старшего возраста. Их тяжесть может возрастать с усилением системной абсорбции бетаметазона дипропионата, увеличением сроков лечения, если препарат наносится на обширные участки тела или в кожные складки. Лечение инфекций кожи с введением гентамицина привносит риск развития аллергических реакций. С увеличением продолжительности терапии риск возникновения аллергии возрастает. Вместе с другими аминогликозидами, такими как неомицин и канамицин, гентамицин относится к группе аллергенов. Аллергическая реакция на местно применяемый гентамицин делает невозможным в будущем проводить системное введение гентамицина и других аминогликозидов. При одновременном системном применении аминогликозидных антибиотиков следует ожидать кумулятивной токсичности (ототоксичности, нефротоксичности) из-за повышенной абсорбции через кожу.

Необходимо обратить внимание на возможную перекрестную аллергию с другими аминогликозидными антибиотиками.

В некоторых случаях долгосрочное применение антибиотиков может приводить к формированию устойчивых вариантов патогенных микроорганизмов, в том числе грибов. В таких случаях, а также при появлении раздражения кожи во время лечения, развития аллергической реакции или суперинфекции введение гентамицина следует прекратить и назначить соответствующее лечение. Системная абсорбция местно применяемого гентамицина может возрастать, если препарат используется на обширных участках поверхности тела, особенно при длительном лечении, или если кожа повреждена. Окклюзионная повязка еще больше усиливает всасывание. В этих условиях могут возникнуть нежелательные эффекты, подобные тем, которые возникают при системном применении активных веществ. В

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

этих случаях рекомендуется соблюдать особую осторожность при применении препарата у детей.

Препарат не следует применять при лечении язв при варикозной болезни вен голени (трофические язвы).

Высокодозное, обширное или окклюзионное применение сильного или очень сильного кортикостероида следует проводить только под регулярным медицинским наблюдением, особенно в отношении подавления эндогенной продукции кортикостероидов и возможных метаболических эффектов.

По возможности не следует превышать непрерывный период применения препарата продолжительностью 2-3 недели.

Длительное непрерывное или неправильное применение местных стероидов может привести к рецидиву в конце лечения (синдром отмены местных стероидов). Может развиться тяжелая форма эффекта рикошета в виде дерматита с интенсивным покраснением, покалыванием и жжением, которые могут распространяться за пределы первоначально обработанной области. Вероятность возникновения выше при обработке чувствительных участков кожи, таких как лицо или складки. Если первоначальные симптомы возвращаются в течение нескольких дней или недель после успешного лечения, можно предположить реакцию отмены. Повторное использование следует проводить с осторожностью, а также обратиться за консультацией к врачу-специалисту или рассмотреть альтернативное лечение.

Очень сильные, сильные и умеренно сильные кортикостероиды следует применять на лице и в области гениталий только с осторожностью и не дольше 1 недели. Вблизи глаз (например, при глаукоме) следует применять только слабодействующие кортикостероиды.

Кортикостероиды могут маскировать симптомы аллергической реакции кожи на один из компонентов препарата.

Нарушения зрения

Нарушения зрения могут возникать при системном и местном (включая трансназальное, ингаляционное и интраокулярное) применении кортикостероидов. Если у пациента наблюдаются такие симптомы, как нечеткость зрения или другие нарушения зрения, следует рассмотреть возможность направления пациента к офтальмологу для оценки возможных причин нарушения зрения. К ним относятся катаракта, глаукома или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР), которые были зарегистрированы после системного и местного применения кортикостероидов.

Дети и подростки

Данный препарат противопоказано применять у детей в возрасте до 2 лет.

Пациенты детского возраста могут иметь большую чувствительность к подавлению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси,

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

вызванную применением местных кортикостероидов, а также экзогенным эффектам кортикостероидов, чем взрослые пациенты, поскольку всасывание препарата выше из-за большего соотношения площади поверхности кожи к массе тела.

У детей, получавших местные кортикостероиды, наблюдались случаи подавления гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, синдром Кушинга, линейная задержка роста, задержка прироста массы тела и внутричерепная гипертензия. Симптомы подавления функции надпочечников у детей включают низкий уровень кортизола в плазме и отсутствие реакции на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Симптомы повышенного внутричерепного давления включают выбухание родничка, головные боли и двусторонний отек диска зрительного нерва.

Другие препараты и препарат Акридерм ДУО

Не рекомендуется совместное применение с другими дерматологическими препаратами ввиду возможного ослабления терапевтического эффекта данного препарата.

Гентамицин взаимодействует с амфотерицином В, гепарином, сульфадиазином, бета-лактамными антибиотиками (например, цефалоспоринами).

При обработке генитальной или анальной области препаратом Акридерм ДУО вспомогательные вещества — белый вазелин и густой парафин — могут снизить прочность на разрыв и, таким образом, ухудшить безопасность презервативов при использовании вместе с латексными презервативами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Аминогликозиды проникают через плаценту и могут нанести вред плоду при назначении беременным женщинам. Имеются сообщения о полной, необратимой, двусторонней врожденной глухоте у детей, матери которых во время беременности принимали аминогликозиды, включая гентамицин. Достаточные данные о применении местного гентамицина у беременных женщин отсутствуют.

Препарат Акридерм ДУО не следует применять во время беременности, за исключением случаев крайней необходимости.

Неизвестно, выделяются ли кортикостероиды, применяемые местно, с молоком. Системно доступные кортикостероиды попадают в молоко.

Данные о проникновении гентамицина сульфата в грудное молоко отсутствуют.

Во время применения препарата Акридерм ДУО не следует кормить грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Данных о неблагоприятном воздействии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами не имеется.

Акридерм ДУО содержит пропилпарагидроксибензоат

Препарат содержит пропилпарагидроксибензоат, который может вызвать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

3. Прием препарата Акридерм ДУО

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат Акридерм ДУО следует наносить один или два раза в день у взрослых и подростком старше 12 лет. При улучшении состояния частота нанесения препарата может быть уменьшена.

Если клиническое улучшение не наступает в течение 2-3 недель, необходимо уточнить диагноз либо изменить схему лечения.

Ввиду содержания в препарате гентамицина, ограничьте продолжительность лечения 5-7 днями.

При соответствующих клинических ситуациях (при некоторых дерматозах, когда больше нет необходимости для введения сильных кортикостероидов или при отсутствии возбудителей суперинфекции, чувствительных к гентамицину) следует продолжать лечение в форме монотерапии менее сильнодействующим кортикостероидом или другими антибиотиками.

Применение у детей и подростков

Не применять препарат для детей в возрасте младше 2 лет.

Не наносите средство чаще двух раз в день, соблюдая интервал не менее 6-12 часов между применениями. Нанесение на лицо, шею, волосистую часть головы, область гениталий, ректальную область и участки кожи с опрелостью следует проводить под наблюдением врача. Ограничьте продолжительность лечения 5-7 днями.

Применение препарата у детей требует большей осторожности, так как, по сравнению с применением кортикостероидных препаратов у взрослых, у детей бетаметазон и гентамицин в большей степени всасываются через кожу. Ввиду возможного всасывания бетаметазона данный препарат не следует использовать в сочетании с окклюзионной повязкой и подгузниками.

У детей этот препарат следует применять, по возможности, в течение минимально короткого периода времени и на небольших участках кожи.

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Препарат следует наносить в виде тонкой пленки, слегка втирая в пораженный участок кожи. Обрабатываемый участок кожи не должен по площади превышать 10 % от общей площади поверхности тела.

Если Вы приняли препарат Акридерм ДУО больше, чем следовало

Симптомы: при длительном непрерывном использовании препарата (хроническая передозировка или злоупотребление) может вызвать подавление функции гипофизарно-надпочечниковой системы, обусловив развитие вторичной надпочечниковой недостаточности. Более того, чрезмерное использование кортикостероидов может способствовать развитию синдрома Кушинга. Избыточное или широкое использование местных антибиотиков может привести к грибковой колонизации раны или формированию антибиотикорезистентного варианта возбудителя.

Лечение: рекомендуется отменить препарат и при необходимости провести симптоматическое лечение. При необходимости проводят коррекцию электролитного баланса. В случае хронической токсичности рекомендуется медленная отмена кортикостероидов. В случае чрезмерного роста резистентных к гентамицину микроорганизмов неэффективное лечение должно быть прекращено и начата адекватная антимикробная терапия.

В случаях хронической токсичности рекомендуется постепенная отмена кортикостероидов.

При повышенном росте нечувствительных микроорганизмов лечение кремом или мазью следует прекратить и начать соответствующую противогрибковую или антибактериальную терапию.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Акридерм ДУО:

В начале терапии

Редко: раздражение, жжение, зуд, сухость, реакции гиперчувствительности на один из компонентов препарата и изменение цвета кожи.

При обширном, окклюзионном и/или длительном применении возможны местные изменения кожи. При применении на больших площадях возможны системные эффекты (подавление частоты сердечных сокращений).

Следует отметить, что существует повышенный риск развития вторичных инфекций из-за снижения местной защиты от инфекции.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Местные изменения кожи, такие как атрофия (особенно на лице), телеангиэктазии, стрии, растяжки, кровоточивость кожи, пурпура, стероидные угри, розацеаподобные или периоральный дерматит, гипертрихоз, изменение цвета кожи. Неизвестно, является ли изменение цвета кожи обратимым.

Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100

- контактная сенсибилизация к гентамицину

Редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000

- раздражение кожи (эритема и зуд)

Неизвестно (невозможно оценить частоту возникновения на основании имеющихся данных):

- установочные реакции - покраснение кожи, которое может выходить за пределы первоначально пораженного участка, ощущение жжения или покалывания, зуд, шелушение кожи, сочащиеся волдыри

Возможная фотосенсибилизация наблюдалась у некоторых пациентов, но не была воспроизведена при повторном нанесении гентамицина с последующим облучением ультрафиолетовыми лучами.

- гипергликемия, задержка роста, синдром Иценко-Кушинга

- подавление синтеза эндогенных кортикостероидов, гиперкортикостероидизм с отеками

- сахарный диабет (проявление ранее скрытого заболевания)

- доброкачественное повышение внутричерепного давления после окончания лечения

- затуманенное зрение

- при лечении больших площадей, использовании окклюзионных повязок или нанесении на поврежденную кожу следует ожидать кумулятивной ототоксичности/нефротоксичности при системном применении аминогликозидных антибиотиков

- повышение артериального давления

- глюкозурия, гипокалиемия

Дети

Неизвестно (невозможно оценить частоту возникновения на основании имеющихся данных):

- угнетение гипофизарно-надпочечниковой системы, замедление роста, повышение внутричерепного давления, сопровождающееся выбуханием родничка, головной болью, отставание в прибавке веса, синдром Кушинга

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.
Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Электронная почта: pdlc@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ndda.kz

5. Хранение препарата Акридерм ДУО

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните при температуре от 15 °С до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акридерм ДУО содержит

Действующими веществами препарата являются бетаметазон и гентамицин.

Каждый 100 г мази содержат бетаметазона дипропионат в пересчете на 100 % вещество – 0,064 г, что эквивалентно 0,05 г бетаметазона, гентамицина сульфат в пересчете на гентамицин – 0,100 г.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропилпарагидроксибензоат (нипазол), парафин жидкий (вазелиновое масло), изопропилпальмитат, вазелин.

Внешний вид препарата Акридерм ДУО и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Полупрозрачная мазь белого или почти белого цвета.

По 15 г или 30 г в тубу алюминиевую.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015292-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
08.07.2026

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-51
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz

Производитель

Россия
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»)
142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения**:**

Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-50
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz; phv@santo.kz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.