КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

Листок-вкладыш - информация для пациента

ТАКРОПИК Макс, 0,03 %, 0,1 %, мазь для наружного применения
Действующее вещество: такролимус

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ТАКРОПИК Макс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ТАКРОПИК Макс.
3. Применение препарата ТАКРОПИК Макс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ТАКРОПИК Макс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат ТАКРОПИК Макс и для чего его применяют

ТАКРОПИК Макс содержит действующее вещество такролимус, который используется для лечения экземы (атопического дерматита) путем нанесения мази на кожу.

Показания к применению

Препарат ТАКРОПИК Макс применяется в дозировке 0,03 % и 0,1 % у взрослых и подростков старше 16 лет, и только 0,03 % у детей от 2 до 16 лет для лечения:

- атопического дерматита (средней степени тяжести и тяжелых форм) в случае его резистентности к иным средствам наружной терапии или наличия противопоказаний к таковым.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

2. О чем следует знать перед применением препарата ТАКРОПИК Макс
Противопоказания
Не применяйте препарат ТАКРОПИК Макс если:

- у Вас аллергия на такролимус или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Вы беременны или кормите грудью;
- Вы страдаете наследственным заболеванием кожного барьера, таким как синдром Незертона, пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз (обширное шелушение кожи из-за утолщения поверхностного слоя кожи);
- у Вас генерализованная эритродермия (воспалительный процесс покраснение и шелушение всей кожи);
- у Вас наблюдалась кожная реакция "трансплантат против хозяина" (иммунная реакция кожи, является распространенным осложнением у пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга).

Применение препарата ТАКРОПИК в дозировке 0,1 % противопоказано у детей и подростков младше 16 лет, в дозировке 0,03 % – у детей младше 2 лет.

Особые указания и меры предосторожности
Перед применением препарата ТАКРОПИК Макс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Сообщите лечащему врачу, прежде чем Вам назначат препарат ТАКРОПИК Макс, если:

- у Вас ослабленный иммунитет и/или Вы принимаете препараты для подавления иммунной системы после трансплантаций, а также при тяжелых кожных, ревматических и кишечных заболеваниях (иммуносупрессивные препараты);
- у Вас запланировано длительное воздействие на кожу солнечных лучей или искусственного света, например, в солярии;
- Вам назначена светотерапия, ультрафиолетовыми лучами Б или А в комбинации с псораленом (препарат, принимаемый внутрь перед лечением УФ-светом);
- у Вас имеются какие-либо потенциально злокачественные или предзлокачественные новообразования кожи (опухоли);
- у Вас имеются дефекты кожного барьера, такие как синдром Нетертона, пластинчатый ихтиоз, генерализованная эритродермия, гангренозная пиодермия или кожная реакция «трансплантат против хозяина»;
- у Вас имеются инфицированные повреждения на коже (при применении препарата ТАКРОПИК Макс повышается риск развития фолликулита и герпетической инфекции (герпетический дерматит [экзема герпетическая], герпес простой, ветряная сыпь Капоши));

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

- у Вас лимфаденопатия (патологическое увеличение лимфатических узлов) или инфекционный мононуклеоз (острое вирусное заболевание).

В течение 2 ч на участках кожи, на которые наносился препарат ТАКРОПИК Макс, нельзя использовать смягчающие средства.
При случайном попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо тщательно удалить и/или промыть водой.
Не рекомендуется наносить мазь ТАКРОПИК Макс под окклюзионные повязки и носить плотную воздухонепроницаемую одежду.
Так же, как при использовании любого другого местного лекарственного средства, необходимо мыть руки после нанесения мази, кроме тех случаев, когда мазь наносится на область рук с лечебной целью.
ТАКРОПИК Макс следует принимать с осторожностью если:

- у Вас декомпенсированная печеночная недостаточность (тяжелое нарушение функции печени);
- у Вас или у Вашего ребенка имеется обширное поражение кожи или если препарат применяется длительными курсами.

Дети и подростки
При лечении детей необходимо проводить постоянную оценку реакции на лечение и постоянной необходимости лечения. Эта должна включать приостановку лечения через 12 месяцев. Влияние препарата ТАКРОПИК Макс на развивающуюся иммунную систему детей в возрасте до 2 лет не установлено.

Другие препараты и препарат ТАКРОПИК Макс
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Это могут быть следующие лекарства:

- *эритромицин* (антибактериальный препарат);
- *итраконазол, кетоконазол* (противогрибковые препараты);
- *дилтиазем* (лекарства, используемые при нарушении ритма, болях сердца, высоком артериальном давлении);
- *живая аттенуированная вакцина* (вакцина с применением ослабленных вирусов или бактерий).

Возможность совместного применения препарата ТАКРОПИК Макс с другими наружными препаратами, системными глюкокортикостероидами и иммунодепрессантами не изучалась.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

ТАКРОПИК Макс не следует применять во время беременности, если только клиническое состояние женщины не требует терапии такролимусом. ТАКРОПИК Макс не следует применять в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Исследования по влиянию препарата на способность управлять автомобилем и на быстроту реакции при работе со сложной техникой, требующей повышенного внимания, не проводились. Препарат ТАКРОПИК Макс применяется наружно и нет оснований полагать, что она может оказывать влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

3. Применение препарата ТАКРОПИК Макс

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Рекомендуемая доза
Взрослым и детям старше 2 лет препарат ТАКРОПИК Макс наносят тонким слоем на пораженные участки кожи. Препарат можно применять на любых участках тела, включая лицо и шею, в области кожных складок. Не следует наносить препарат на слизистые оболочки и под окклюзионные повязки.
Особые группы пациентов
Применение у детей (2 года и старше) и подростков до 16 лет
Лечение необходимо начинать с нанесения 0,03 % мази ТАКРОПИК Макс два раза в сутки. Продолжительность лечения по данной схеме не должна превышать трех недель. В дальнейшем частота применения уменьшается до одного раза в сутки, лечение продолжается до полного очищения очагов поражения.
Применение у взрослых и подростков 16 лет и старше
Лечение необходимо начинать с применения 0,1 % мази ТАКРОПИК Макс два раза в сутки и продолжать до полного очищения очагов поражения. По мере улучшения можно уменьшать частоту нанесения 0,1 % мази или переходить на использование 0,03 % мази ТАКРОПИК Макс. В случае повторного возникновения симптомов заболевания следует возобновить лечение 0,1 % мазью ТАКРОПИК Макс дважды в день. Если позволяет клиническая картина, следует предпринять попытку снизить частоту применения препарата, либо использовать меньшую дозировку – 0,03 % мазь ТАКРОПИК Макс.
Применение у людей пожилого возраста (65 лет и старше)
Особенности применения у людей пожилого возраста отсутствуют. Обычно улучшение наблюдается в течение одной недели с момента начала терапии.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

Если признаки улучшения на фоне терапии отсутствуют в течение двух недель, следует рассмотреть вопрос о смене терапевтической тактики.

Лечение обострений

Препарат ТАКРОПИК Макс может использоваться кратковременно или длительно в виде периодически повторяющихся курсов терапии. Лечение пораженных участков кожи проводится до полного исчезновения клинических проявлений атопического дерматита. Как правило, улучшение наблюдается в течение первой недели лечения. Если признаки улучшения не наблюдаются в течение двух недель с момента начала использования мази, необходимо рассмотреть другие варианты дальнейшего лечения. Лечение следует возобновить при появлении первых признаков обострения атопического дерматита.

Профилактика обострений

Для предупреждения обострений и увеличения длительности ремиссии у пациентов с частыми (более 4 раз в год) обострениями заболевания в анамнезе рекомендуется поддерживающая терапия препаратом ТАКРОПИК Макс.

Целесообразность назначения поддерживающей терапии определяется эффективностью предшествующего лечения по стандартной схеме (2 раза в день) на протяжении не более 6 недель.

При поддерживающей терапии мазь ТАКРОПИК Макс следует наносить 2 раза в неделю (например, в понедельник и четверг) на участки кожи, обычно поражаемые при обострениях.

Промежуток времени между нанесением препарата должен составлять не менее 2–3 дней.

Применение у детей и подростков

У взрослых и подростков 16 лет и старше используется 0,1 % мазь ТАКРОПИК Макс, у детей (2 года и старше) – 0,03 % мазь ТАКРОПИК Макс. При проявлении признаков обострения следует перейти к обычному режиму терапии мазью ТАКРОПИК Макс (см. раздел «Лечение обострений»).

Через 12 месяцев поддерживающей терапии необходимо оценить клиническую динамику и решить вопрос о целесообразности продолжения профилактического использования препарата ТАКРОПИК Макс. У детей для оценки клинической динамики следует временно отменить препарат и затем рассмотреть вопрос о необходимости продолжения поддерживающей терапии.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения препаратом ТАКРОПИК Макс устанавливается лечащим врачом.

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

Если Вы применили препарат ТАКРОПИК Макс больше, чем следовало

При местном применении случаев передозировки не отмечалось.

При попадании внутрь необходимо предпринять общепринятые меры, которые включают контроль жизненно важных функций организма и наблюдение за общим состоянием.

Стимуляция рвоты или промывание желудка не рекомендуются.

Если Вы прекратили применение препарата ТАКРОПИК Макс

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее частыми нежелательными реакциями являются симптомы раздражения кожи (ощущение жжения и зуда, покраснение, боль, парестезии и сыпь) в месте нанесения. Характерным проявлением раздражения кожи была эритема. Как правило, они выражены умеренно и проходят в течение первой недели после начала лечения.

Эритема была распространенной побочной реакцией, связанной с раздражением кожи. Также часто наблюдались ощущение тепла, боль, парестезия и сыпь в месте нанесения.

Часто встречается непереносимость алкоголя (покраснение лица или симптомы раздражения кожи после употребления спиртных напитков).

У пациентов, применяющих препарат ТАКРОПИК Макс, отмечается повышенный риск развития фолликулита, акне и герпетической инфекции.

Прочие нежелательные реакции

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10)

- жжение и зуд в месте применения

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10)

- местные кожные инфекции независимо от конкретной этиологии, включая, помимо прочего: герпетическую экзему (экзему Капоши), фолликулит, простой герпес, прочие герпетические инфекции;
- непереносимость алкоголя (покраснение лица или раздражение кожи после употребления алкоголя);
- парестезии, и дизестезия (гиперестезия, ощущение жжения);
- зуд;
- жжение, зуд, ощущение тепла, покраснение, боль, раздражение, парестезии, сыпь в месте применения

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100)

- акне

Неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно

КМФК МЗ РК
ЛП-№015291-РГ-KZ
УТВЕРЖДЕНО
17.09.2026

- офтальмогерпетическая инфекция;
- розацеа, лентиго
- отек в месте применения;
- повышение уровня препарата.

Обратитесь к врачу, если у Вас есть кожная инфекция или если побочные реакции не проходят.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13
БЦ «Нурсаулет 2»
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Адрес электронной почты: pdlc@dari.kz
Сайт: http://www.ndda.kz

5. Хранение препарата ТАКРОПИК Макс

Хранить при температуре не выше 25 °C.
Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Дата истечения срока годности (срока хранения)

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если Вы заметили описание видимых признаков непригодности препарата для применения.
Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат ТАКРОПИК Макс содержит
Действующим веществом препарата является такролимус
100 г препарата содержит 0.03 г (0.03 %) и 0.10 г (0.1 %) действующего вещества в пересчете на 100 % вещество.
Прочими вспомогательными веществами являются: макрогол-400, парафин жидкий, вазелин белый мягкий, воск эмульсионный, динатрия эдетат, консервант Euxyl PE 9010 (феноксиэтанол 90 %, этилгексилглицерол 10 %), вода очищенная.

Внешний вид ТАКРОПИК Макс и содержимое упаковки
Однородная мазь белого или почти белого цвета.
Допускается наличие слабого специфического запаха
По 15 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-51
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz

Производитель
Россия
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-50
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42

Адрес электронной почты: complaints@santo.kz; phv@santo.kz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.