Листок-вкладыш – информация для пациента

Максигра Strong, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Максигра Strong, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Действующее вещество: силденафил.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Максигра Strong, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Максигра Strong
3. Прием препарата Максигра Strong
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Максигра Strong
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

¶

1. Что из себя представляет препарат Максигра Strong, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Максигра Strong является силденафил, который относится к группе ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ5).

Показания к применению
Эректильная дисфункция, характеризующаяся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта.
Препарат Максигра Strong эффективен только при сексуальной стимуляции.

Способ действия препарата Максигра Strong
Препарат расширяет кровеносные сосуды полового члена при сексуальном возбуждении. В результате усиливается кровоток в половом члене, что способствует наступлению нормальной эрекции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.
¶

2. О чем следует знать перед приемом препарата Максигра Strong

¶
Противопоказания
Не принимайте Максигра Strong:

- если у Вас аллергия на силденафил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы принимаете **препараты, относящиеся к группе нитратов**, поскольку подобная комбинация может привести к резкому падению артериального давления. Если Вы принимаете такие препараты (как правило, они используются для купирования или профилактики приступов стенокардии, «боли за грудиной»). Если Вы не уверены в этом, обратитесь к Вашему врачу.
- если Вы принимаете **препараты, являющиеся донаторами оксида азота**, такие как амилнитрит («попперсы»), поскольку подобная комбинация может привести к угрожающему падению артериального давления;
- если Вы принимаете риоцигуат. Этот препарат используется для лечения легочной артериальной гипертензии (т.е. высокого кровяного давления в легких) и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (т.е. высокого кровяного давления в легких, вторичного по отношению к сгусткам крови). Было показано, что ингибиторы ФДЭ5, такие как Максигра Strong, усиливают гипотензивные эффекты этого препарата. Если Вы принимаете риоцигуат или не уверены, сообщите об этом своему врачу.
- если у Вас имеется **тяжелое заболевание сердца или печени**;
- если Вы недавно перенесли **инсульт или сердечный приступ**, либо если у Вас **пониженное артериальное давление**;
- если у Вас имеется редкие **наследственные заболевания глаз** (например, пигментный ретинит);
- если у Вас когда-либо отмечалась **потеря зрения**, связанная с неартериитической передней ишемической нейропатией зрительного нерва.

Если любое из вышеперечисленного применимо к Вам, не принимайте препарат Максигра Strong и обратитесь к врачу.

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Максигра Strong проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:
- если у Вас имеются следующие заболевания: серповидно-клеточная анемия (патология эритроцитов), лейкемия (рак клеток крови), множественная миелома (рак костного мозга);
- если у Вас имеется деформация полового члена или заболевание Пейрони;
- если у Вас есть какая-либо сердечная патология. Следует пройти тщательное медицинское обследование у Вашего врача на предмет того, допустима ли дополнительная нагрузка на сердце, связанная с половым актом;
- если у Вас в настоящее время имеется язва желудка или Вы страдаете заболеванием, сопровождающимся кровотечениями (например, гемофилией).

В случае если Вы станете отмечать резкое снижение зрения или потерю зрения, прекратите прием препарата Максигра Strong и незамедлительно обратитесь к Вашему врачу.

Препарат Максигра Strong нельзя применять в сочетании с другими пероральными или местными средствами, предназначенными для лечения нарушений эрекции.

Препарат Максигра Strong нельзя применять в сочетании с препаратами для лечения легочной гипертензии, содержащими силденафил или другие ингибиторы ФДЭ5.

Препарат Максигра Strong не следует применять, если у Вас нет эректильной дисфункции.

Препарат Максигра Strong не следует применять, если Вы женщина.

Особые указания по применению у пациентов с заболеваниями почек или печени
Если у Вас есть заболевания почек или печени, проконсультируйтесь с Вашим врачом. Ваш врач может принять решение относительно необходимости снижения дозы препарата.

Дети и подростки
Препарат Максигра Strong не предназначен для применения у детей и подростков младше 18 лет.

Другие препараты и препарат Максигра Strong
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Препарат Максигра Strong может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, особенно с теми, которые применяются для купирования и профилактики загрудинной боли. В случае возникновения неотложных состояний, Вам следует сообщить Вашему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимали препарат Максигра Strong, и указать время его приема. Не принимайте препарат Максигра Strong совместно с другими лекарственными препаратами до тех пор, пока Ваш врач не подтвердит допустимость подобной комбинации.

Вам не следует принимать препарат Максигра Strong, если Вы принимаете препараты, относящиеся к группе нитратов, поскольку подобная комбинация может привести к опасному снижению артериального давления. Если Вы принимаете такие препараты (как правило, они используются для купирования или профилактики приступов стенокардии, «боли за грудиной»), то всегда информируйте Вашего врача об этом.

Вам не следует принимать препарат Максигра Strong, если Вы принимаете какие-либо препараты, являющиеся донаторами оксида азота, такие как амилнитрит («попперсы»), поскольку подобная комбинация может привести к угрожающему падению артериального давления.

Сообщите Вашему врачу или работнику аптеки, если Вы уже принимаете риоцигуат.

Если Вы принимаете лекарственные препараты, относящиеся к группе ингибиторов протеазы, например, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, то Ваш врач может порекомендовать Вам начать прием препарата Максигра Strong с минимальной дозы (25 мг).

Некоторые пациенты, принимающие альфа-адреноблокаторы для лечения артериальной гипертензии или гипертрофии предстательной железы, могут отмечать легкое или выраженное головокружение, что может быть связано со снижением артериального давления после быстрой смены положения тела при вставании или присаживании. Некоторые пациенты сообщали о появлении указанных симптомов при приеме препарата Максигра Strong с альфа-адреноблокаторами. Наиболее высока вероятность возникновения данных симптомов в течение 4 часов после приема препарата Максигра Strong. Для снижения риска развития указанных симптомов Вам следует подобрать оптимальную суточную дозу альфа-адреноблокатора до начала лечения препаратом Максигра Strong. Ваш врач может порекомендовать начать прием препарата Максигра Strong с минимальной дозы (25 мг).

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете препараты, содержащие сакубитрил с валсартаном, используемые для лечения сердечной недостаточности.

Препарат Максигра Strong с пищей и напитками
Препарат Максигра Strong можно принимать вместе с пищей и отдельно. Однако Вы можете обнаружить, что после приема препарата Максигра Strong вместе с тяжелой мясной пищей он медленнее начинает действовать.

Прием алкоголя может временно нарушать эрекцию. Для достижения максимального терапевтического эффекта от препарата Вам не следует злоупотреблять алкоголем перед приемом препарата Максигра Strong.

Беременность и грудное вскармливание
Препарат Максигра Strong не предназначен для применения у женщин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Силденафил может вызывать головокружение и может влиять на зрение. Вам следует убедиться, как Вы переносите препарат Максигра Strong до того, как управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Максигра Strong содержит натрий
Препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, покрытой оболочкой, то есть считается, что он «не содержит натрия».

¶

3. Прием препарата Максигра Strong

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:
Рекомендуемая доза препарата Максигра Strong составляет 50 мг внутрь примерно за 1 час до полового акта. С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100 мг или уменьшена до 25 мг. Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг.

Проглотите таблетку целиком и запейте стаканом воды.
Не следует применять препарат Максигра Strong чаще одного раза в сутки.
Не принимайте препарат Максигра Strong, в сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими силденафил.

Если Вы ощущаете, что препарат Максигра Strong оказывает чрезмерный эффект либо, наоборот, недостаточный эффект, обратитесь к Вашему врачу.
Препарат Максигра Strong способствует наступлению эрекции только при наличии сексуального возбуждения. Действие препарата Максигра Strong начинается в разные сроки у разных людей, но обычно оно проявляется в течение от 30 минут до одного часа. После обильной еды действие препарата Максигра Strong может начаться позднее.

Если препарат Максигра Strong не облегчает наступление эрекции или эрекция сохраняется недостаточно долго для завершения полового акта, Вам следует обратиться к Вашему врачу.

Если Вы приняли препарата Максигра Strong больше, чем следовало
При передозировке Вы можете отмечать увеличение числа нежелательных реакций и их утяжеление. Увеличение дозы более 100 мг не сопровождается увеличением эффективности. Не принимайте больше таблеток, чем Вам рекомендовано врачом. Если Вы примете больше таблеток, чем было Вам рекомендовано, немедленно обратитесь к Вашему врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
¶

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Если у Вас возникнут любые из приведенных ниже серьезных нежелательных реакций, прекратите прием препарата Максигра Strong и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью:

- Аллергические реакции – данные нежелательные реакции встречаются **нечасто** (не более чем у 1 человека из 100)**. К их проявлениям относятся внезапно возникшее свистящее дыхание, затруднение дыхания или головокружение, отек век, лица, губ или горла.**
- Боли в груди – данная нежелательная реакция встречается **нечасто.**
  Если данная нежелательная реакция развивается во время либо после полового акта
  - Примите полусидячее положение и попытайтесь расслабиться.
  - **Не принимайте нитраты** для купирования боли в груди.
- Пролонгированная и иногда болезненная эрекция – данная нежелательная реакция встречается **редко** (не более чем у 1 человека из 1000).
  Если продолжительность эрекции у Вас превышает 4 часа, Вам следует незамедлительно обратиться к врачу.
- Внезапное снижение или потеря зрения – данные нежелательные реакции встречаются **редко.**
- Тяжелые кожные реакции – данные нежелательные реакции встречаются **редко.**
  Проявлением данных нежелательных реакций может быть отслаивание эпидермиса и тяжелый отек кожи, появление буллезных высыпаний на языке, гениталиях и вокруг глаз, лихорадка.
- Судороги или приступы эпилепсии – данные нежелательные реакции встречаются **редко.**

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Максигра Strong
Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10): головная боль.
Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): тошнота, приливы крови к лицу, приливы жара (проявления включают внезапное ощущение жара в верхней части тела), диспепсия, хроматопсия (изменение восприятия оттенков цвета), затуманенное зрение, нарушение зрения, заложенность носа и головокружение.
Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): рвота, кожная сыпь, раздражение глаз, покраснение глаз, боль в глазах, ощущений вспышек света перед глазами, увеличение яркости зрения, гиперчувствительность к свету, слезотечение, колотящееся сердцебиение, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, понижение артериального давления, боль в мышцах, сонливость, уменьшение

тактильной чувствительности, вертиго, звон в ушах, сухость во рту, заблокированность или заложенность придаточных пазух носа, воспаление слизистой оболочки полости носа (симптомы включают ринорею, чихание и заложенность носа), боль в верхних отделах живота, гастро-эзофагальный рефлюкс (симптомы включают изжогу), появление крови в моче, боль в верхних и нижних конечностях, носовые кровотечения, ощущение жара и утомляемость.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): обморок, инсульт, сердечный приступ, неритмичное сердцебиение, преходящее нарушение кровотока в различных отделах мозга, чувство сжатия горла, онемение рта, кровоизлияние в заднюю камеру глаза, двоение в глазах, уменьшение остроты зрения, нарушение чувствительности в глазах, припухлость глаз и век, мелькание мушек перед глазами, появление ореолов вокруг источников света, расширение зрачка, изменение цвета белков глаз, кровотечение из полового члена, появление крови в сперме, сухость в носу, отек слизистой носовой полости, раздражительность и внезапное уменьшение или потеря слуха.

По данным пострегистрационных наблюдений, случаи развития нестабильной стенокардии (сердечная патология) и внезапной смерти отмечались редко. Следует отметить, что большинство этих мужчин (но не все) имели сердечную патологию и до приема данного препарата. Невозможно установить, были ли эти случаи непосредственно связаны с приемом силденафила.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Адрес электронной почты: pdlc@dari.kz
Сайт: http://www.ndda.kz

¶

5. Хранение препарата Максигра Strong

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги и света, при температуре не выше 25°С.

¶

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.¶

¶
¶

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Максигра Strong содержит
Действующим веществом является силденафил.
Каждая таблетка препарата Максигра Strong, 50 мг содержит 70,24 мг силденафила цитрата (эквивалентно силденафилу 50 мг).
Каждая таблетка препарата Максигра Strong, 100 мг содержит 140,48 мг силденафила цитрата (эквивалентно силденафилу 100 мг).
Прочими (вспомогательными) веществами являются: маннитол, кросповидон, повидон (К30), кремния диоксид коллоидный, крахмал кукурузный, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, гипромеллоза (15 mPas), макрогол 6000, титана диоксид (Е171), тальк, индигокармин (Е132).

Внешний вид препарата Максигра Strong и содержимое упаковки
Максигра Strong, 50 мг: таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета, диаметром (8,0-8,4) мм.
Максигра Strong, 100 мг: таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета, диаметром (10,0-10,4) мм.

По 1 или 4 таблетки помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1, 2, 3 или 4 контурных упаковок вместе с листком-вкладышем на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-51
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42
Адрес электронной почты: complaints@santo.kz

Производитель
Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО
ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:
Республика Казахстан
Акционерное общество «Химфарм» (АО «Химфарм»)
160019, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81
Номер телефона: +7 (7252) 61-01-50
Номер автоответчика: +7 (7252) 56-13-42

Адрес электронной почты: complaints@santo.kz; phv@santo.kz

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
_____ (на 7 листах)
ПАРАҚ / ЛИСТОВ
КҮНІ / ДАТА 01.04.2026

Қосымша парақ – пациентке арналған ақпарат

Максигра Strong, 50 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар
Максигра Strong, 100 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар
Әсер етуші зат: силденафил.

Препаратты қабылдар алдында қосымша парақты толық оқып шығыңыз, себебі онда сіз үшін маңызды мәліметтер бар.
- Қосымша парақты сақтаңыз. Сізге оны тағы бір рет оқып шығу қажет болуы мүмкін.
- Егер сізде қосымша сұрақтар туындаса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.
- Препарат сізге ғана тағайындалған. Оны басқа адамдарға бермеңіз. Ол, егер тіпті олардың ауру симптомдары сіздегімен сәйкес болса да, оларға зиян тигізуі мүмкін.
- Егер сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар пайда болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз. Осындай нұсқау кез келген болуы мүмкін, оның ішінде қосымша парақтың 4-бөлімінде атап көрсетілмеген жағымсыз реакцияларға да қатысты болады.

Қосымша парақтың мазмұны

1. Максигра Strong қандай препарат және оны не үшін қолданады
2. Максигра Strong препаратын қабылдар алдында не туралы білу керек
3. Максигра Strong препаратын қабылдау
4. Болуы мүмкін жағымсыз реакциялар
5. Максигра Strong препаратын сақтау
6. Қаптаманың ішіндегісі және басқа да мәліметтер

1. Максигра Strong қандай препарат және оны не үшін қолданады

Максигра Strong препаратының әсер етуші заты силденафил болып табылады, ол 5 типті фосфодиэстераза (ФДЭ5) тежегіштері тобына жатады.

Қолданылуы
Қанағаттанарлық жыныстық қатынас үшін жеткілікті жыныстық мүшенің эрекциясына қол жеткізе алмауымен немесе оны сақтай алмауымен сипатталатын эректильді дисфункция.
Максигра Strong препараты тек жыныстық стимуляциялау кезінде ғана тиімді.

Максигра Strong препаратының әрекет ету тәсілі
Препарат жыныстық қозу кезінде жыныс мүшесінің қан тамырларын кеңейтеді. Нәтижесінде жыныс мүшесіндегі қан ағымы жоғарылайды, бұл қалыпты эрекцияның басталуына ықпал етеді.

Егер жақсару болмаса немесе сіз нашарлай бастасаңыз, дәрігермен кеңесу керек.¶

2. Максигра Strong препаратын қабылдар алдында не туралы білу керек

Қолдануға болмайтын жағдайлар
Максигра Strong қабылдамаңыз:
- егер Сізде силденафилге немесе препараттың кез келген басқа компоненттеріне (қосымша парақтың 6-бөлімінде келтірілгендер) аллергия болса;
- егер Сіз **нитраттар тобына жататын препараттарды** қабылдасаңыз, өйткені мұндай

біріктірім артериялық қысымның күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін. Егер сіз осындай препараттарды қабылдасаңыз (әдетте олар стенокардия ұстамаларын, «төс артындағы ауырсынудың» басылуы немесе профилактикасы үшін қолданылады). Егер сіз бұған сенімді болмасаңыз, дәрігеріңізге қаралыңыз.

- егер Сіз амилнитрит («попперстер») сияқты **азот тотығының донаторлары болып табылатын препараттарды** қабылдасаңыз, өйткені мұндай біріктірім артериялық қысымның қауіпті төмендеуіне әкелуі мүмкін;
- егер Сіз риоцигуат қабылдасаңыз. Бұл препарат өкпе артериялық гипертензиясын (яғни өкпедегі жоғары қан қысымы) және созылмалы тромбоэмболиялық өкпе гипертензиясын (яғни қан ұйындыларына қатысты салдарлы өкпедегі жоғары қан қысымын) емдеу үшін қолданылады. Максигра Strong сияқты ФДЭ5 тежегіштері осы препараттың гипотензиялық әсерін күшейтетіні көрсетілген. Егер сіз риоцигуат қабылдап жүрсеңіз немесе сенімді болмасаңыз, бұл туралы дәрігеріңізге хабарлаңыз.
- егер Сізде **жүректің немесе бауырдың ауыр ауруы** болса;
- егер Сіз таяуда **инсульт немесе жүрек ұстамасын** бастан өткерсеңіз немесе **артериялық қысымыңыз төмендеген болса**;
- егер Сізде сирек кездесетін **тұқым қуалайтын көз аурулары** бар болса (мысалы, пигментті ретинит);
- егер Сізде көру жүйкесінің артериялық емес алдыңғы ишемиялық нейропатиясымен байланысты **көру қабілетінің жоғалуы** байқалса.

Егер жоғарыда айтылғандардың кез келгені сізге қатысты болса, Максигра Strong препаратын қабылдамаңыз және дәрігерге қаралыңыз.

Айрықша нұсқаулар және сақтандыру шаралары

Максигра Strong препаратын қабылдар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз:

- егер Сізде келесі аурулар болса: орақ тәрізді жасушалы анемия (эритроциттердің патологиясы), лейкемия (қан жасушаларының обыры), көптеген миелома (сүйек кемігінің обыры);
- егер Сізде жыныс мүшесінің деформациясы немесе Пейрони ауруы болса;
- егер сізде қандай да бір жүрек патологиясы болса. Дәрігеріңізде жыныстық қатынасқа байланысты жүрекке қосымша жүктеме рұқсат етілген бе, соған қатысты мұқият медициналық тексеруден өту керек;
- егер қазіргі уақытта сізде асқазан ойықжарасы бар немесе қан кетумен (мысалы, гемофилия) бірге жүретін аурумен ауырсаңыз.

Егер Сіз көру қабілетінің күрт төмендеуін немесе көру қабілетінің жоғалуын байқасаңыз, Максигра Strong препаратын қабылдауды тоқтатыңыз және дереу дәрігеріңізге хабарласыңыз.

Максигра Strong препаратын эрекцияның бұзылуын емдеуге арналған басқа пероральды немесе жергілікті дәрілермен бірге қолдануға болмайды.

Максигра Strong препаратын құрамында силденафил немесе басқа ФДЭ5 тежегіштері бар өкпе гипертензиясын емдеуге арналған препараттармен бірге қолдануға болмайды.

Егер сізде эректильді дисфункция болмаса, Максигра Strong препаратын қолдануға болмайды.

Егер сіз әйел болсаңыз, Максигра Strong препаратын қолдануға болмайды.

Бүйрек немесе бауыр аурулары бар пациенттерде қолдану жөніндегі айрықша нұсқаулар.

Егер сізде бүйрек немесе бауыр аурулары болса, дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дәрігеріңіз препараттың дозасын азайту қажеттілігіне қатысты шешім қабылдауы мүмкін.

Балалар мен жасөспірімдер
Максигра Strong препараты балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерде қолдануға арналмаған.

Басқа препараттар және Максигра Strong препараты
Сіздің қандай да бір басқа препараттарды қабылдап жүргеніңіз, таяуда қабылдағаныңыз немесе қабылдай бастауыңыз мүмкін екені жөнінде емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне мәлімдеңіз.
Максигра Strong препараты кейбір дәрілік препараттармен, әсіресе төс артындағы ауырсынудың басылуы және профилактикасы үшін қолданылатындармен өзара әрекеттесуі мүмкін. Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда дәрігеріңізге немесе дәріхана қызметкеріне Максигра Strong препаратын қабылдағаныңыз туралы хабарлап, оны қабылдау уақытын көрсетуіңіз керек. Дәрігеріңіз мұндай біріктірімнің жарамдылығын растамайынша, Максигра Strong препаратын басқа препараттармен бірге қабылдамаңыз.

Егер Сіз нитраттар тобына жататын препараттарды қабылдасаңыз, Сізге Максигра Strong препаратын қабылдауға болмайды, өйткені мұндай біріктірім артериялық қысымның қауіпті төмендеуіне әкелуі мүмкін. Егер Сіз осындай препараттарды қабылдасаңыз (әдетте олар стенокардия ұстамаларын, «төс артындағы ауырсынудың» басылуы немесе профилактикасы үшін қолданылады), онда әрқашан дәрігеріңізге бұл туралы хабарлаңыз.

Егер Сіз амилнитрит («попперстер») сияқты азот тотығының донаторлары болып табылатын қандай да бір препараттарды қабылдасаңыз, Максигра Strong препаратын қабылдауға болмайды, өйткені мұндай біріктірім артериялық қысымның қауіпті төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Егер Сіз риоцигуат қабылдаған болсаңыз, дәрігеріңізге немесе дәріхана қызметкеріне хабарлаңыз.

Егер Сіз протеаза тежегіштері тобына жататын дәрілік препараттарды, мысалы, АИТВ-инфекциясын емдеуге арналған препараттарды қабылдап жүрсеңіз, дәрігеріңіз Сізге ең төмен дозада (25 мг) Максигра Strong препаратын қабылдауды бастауды ұсынуы мүмкін.

Артериялық гипертензияны немесе қуықасты безі гипертрофиясын емдеу үшін альфа-адреноблокаторларды қабылдайтын кейбір пациенттер жеңіл немесе айқын бас айналуды байқауы мүмкін, бұл тұру немесе отыру кезінде дене қалпын жылдам өзгерткеннен кейін артериялық қысымның төмендеуімен байланысты болуы мүмкін. Кейбір пациенттер альфа-адреноблокаторлармен Максигра Strong препаратын қабылдаған кезде аталған симптомдардың пайда болғанын хабарлады. Максигра Strong препаратын қабылдағаннан кейін 4 сағат ішінде осы симптомдардың пайда болу ықтималдығы жоғарырақ. Көрсетілген симптомдардың даму қаупін азайту үшін Максигра Strong препаратымен емдеуді бастамас бұрын альфа-адреноблокатордың оңтайлы тәуліктік дозасын таңдау керек. Дәрігеріңіз ең аз дозадан (25 мг) Максигра Strong препаратын қабылдауды бастауды ұсынуы мүмкін.

Жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылатын құрамында сакубитрил мен валсартан бар препараттарды қабылдап жүрсеңіз, дәрігеріңізге немесе дәріхана қызметкеріне хабарлаңыз.

Тамақпен және сусындармен Максигра Strong препараты

Максигра Strong препаратын тамақпен бірге және бөлек қабылдауға болады. Дегенмен, Сіз ауыр ет тағамдарымен бірге Максигра Strong препаратын қабылдағаннан кейін, ол баяу әсер ете бастайтынын байқайсыз.

Алкогольді қабылдау эрекцияны уақытша бұзуы мүмкін. Препараттың ең жоғары терапиялық әсеріне қол жеткізу үшін Максигра Strong препаратын қабылдар алдында алкогольді шамадан тыс тұтынуға болмайды.

Жүктілік және бала емізу
Максигра Strong препараты әйелдерге қолдануға арналмаған.

Көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу
Силденафил бас айналуды тудыруы және көру қабілетіне әсер етуі мүмкін. Сіз көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу алдында Максигра Strong препаратын қалай көтеретіндігіңізге көз жеткізуіңіз керек.

Максигра Strong препаратының құрамында натрий бар
Препараттың құрамында қабықпен қапталған бір таблеткада 1 ммольден (23 мг) аз натрий бар, яғни оның «құрамында натрий жоқ» деп саналады.

3. Максигра Strong препаратын қабылдау

Препаратты әрдайым емдеуші дәрігердің немесе дәріхана қызметкерінің ұсынымдарына сәйкес қабылдаңыз. Егер күмән туындаса, емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз.

Ұсынылатын доза:
Максигра Strong препаратының ұсынылатын дозасы жыныстық қатынасқа дейін шамамен 1 сағат бұрын ішке қабылданатын 50 мг құрайды. Тиімділік пен жағымдылығын ескере отырып, дозаны 100 мг-ге дейін арттыруға немесе 25 мг-ге дейін төмендетуге болады. Ұсынылатын ең жоғары доза 100 мг құрайды.

Таблетканы бір стақан сумен іше отырып, тұтастай жұту қажет.
Максигра Strong препаратын тәулігіне бір реттен артық қолдануға болмайды.
Құрамында силденафил бар басқа дәрілік заттармен бірге Максигра Strong препаратын қабылдамаңыз.

Егер Сіз Максигра Strong препаратының шамадан тыс әсер ететінін немесе, керісінше, жеткіліксіз әсер ететінін сезсеңіз, дәрігеріңізге хабарласыңыз.
Максигра Strong препараты сексуалдық қозу болған кезде ғана эрекцияның басталуына ықпал етеді. Максигра Strong препаратының әсері әр түрлі адамдарда әр түрлі мерзімде басталады, бірақ ол әдетте 30 минуттан бір сағатқа дейін білінеді. Тамақты көп тұтынған кезде Максигра Strong препаратының әсері кейінірек басталуы мүмкін.

Егер Максигра Strong препараты эрекцияның басталуын жеңілдетпесе немесе эрекция жыныстық қатынасты аяқтау үшін жеткілікті ұзақ сақталмаса, дәрігеріңізбен кеңесу керек.

Егер Сіз Максигра Strong препаратын қажет болғаннан көп қабылдаған болсаңыз
Артық дозаланған кезде Сіз жағымсыз реакциялар санының көбеюін және олардың ауырлығын байқай аласыз. 100 мг-дан асатын дозаның артуы тиімділіктің жоғарылауымен қатар жүрмейді. Дәрігер ұсынғаннан көп таблетка қабылдамаңыз. Егер Сіз ұсынылғаннан

көп таблетка қабылдасаңыз, дереу дәрігеріңізге хабарласыңыз.

Егер препаратты қолдану жөніндегі сұрақтар болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

4. Болуы мүмкін жағымсыз реакциялар

Барлық дәрілік препараттар сияқты, препарат жағымсыз реакцияларды тудыруы мүмкін, бірақ олар бәрінде бола бермейді.
Егер сізде төменде келтірілген күрделі жағымсыз реакциялар туындаса, Максигра Strong препаратын қабылдауды тоқтатыңыз және дереу медициналық көмекке жүгініңіз:

- Аллергиялық реакциялар – осы жағымсыз реакциялар **жиі емес** кездеседі (100 адамның көп дегенде 1-де). **Олардың көріністеріне кенеттен пайда болған ысқырып дем алу, тыныстың тарылуы немесе бас айналуы, қабақтың, беттің, еріннің немесе тамақтың ісінуі жатады.**
- Кеудедегі ауырсыну – осы жағымсыз реакция **жиі емес** кездеседі.
  Егер осы жағымсыз реакция жыныстық қатынас кезінде немесе одан кейін пайда болса
  - Жартылай отырыңыз және демалуға тырысыңыз.
  - Кеудедегі ауырсынуды басу үшін **нитраттарды қабылдамаңыз**.
- Ұзартылған және кейде ауыртатын эрекция – осы жағымсыз реакция **сирек** (1000 адамның көп дегенде 1-де) кездеседі.
  Егер сізде эрекцияның ұзақтығы 4 сағаттан асса, дереу дәрігерге қаралу керек.
- Көрудің кенеттен төмендеуі немесе жоғалуы – осы жағымсыз реакциялар **сирек** кездеседі.
- Терінің ауыр реакциялары – осы жағымсыз реакциялар **сирек** кездеседі.
  Осы жағымсыз реакциялардың көрінісі эпидермистің қабыршақтануы және терінің қатты ісінуі, тілде, жыныс мүшелерінде және көз айналасында буллезді бөртпелердің пайда болуы, қызба болуы мүмкін.
- Құрысулар немесе эпилепсия ұстамалары – осы жағымсыз реакциялар **сирек** кездеседі.

Максигра Strong препаратын қабылдаған кезде байқалуы мүмкін басқа да болуы мүмкін жағымсыз реакциялар
Өте жиі (10 адамның 1-нен көбінде туындауы мүмкін): бас ауыруы.
Жиі (10 адамның көп дегенде 1-де туындауы мүмкін): жүрек айнуы, бетке қан тебу, ысыну (көріністерге дененің жоғарғы бөлігіндегі кенеттен ысыну сезімі жатады), диспепсия, хроматопсия (түс реңктерін қабылдаудың өзгеруі), көрудің бұлыңғырлануы, көру қабілетінің бұзылуы, мұрынның бітелуі және бас айналуы.
Жиі емес (100 адамның көп дегенде 1-де туындауы мүмкін): құсу, тері бөртпесі, көздің тітіркенуі, көздің қызаруы, көздің ауыруы, көз алдында жарықтың жарқылын сезіну, айқын көрудің жоғарылауы, жарыққа аса жоғары сезімталдық, көзден жас ағу, жүректің тарсылдап соғуы, жүрек соғуының жиілеуі, артериялық қысымның жоғарылауы, артериялық қысымның төмендеуі, бұлшықеттердің ауырсынуы, ұйқышылдық, тактильді сезімталдықтың төмендеуі, вертиго, құлақтың шыңылдауы, ауыз кеберсуі, мұрынның қосалқы қуыстарының бөгелуі немесе бітелуі, мұрын қуысының шырышты қабығының қабынуы (симптомдарға ринорея, түшкіру және мұрынның бітелуі жатады), іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы, гастро-эзофагальды рефлюкс (симптомдарға қызыл жатады), несепте қанның пайда болуы, қол мен аяқтың ауыруы, мұрыннан қан кету, ысыну сезімі және қажу.
Сирек (100 адамның көп дегенде 1-де туындауы мүмкін): естен тану, инсульт, жүрек ұстамасы, жүректің ырғақсыз соғуы, мидың әртүрлі бөліктеріндегі қан ағымының өтпелі бұзылуы, тамақтағы қысылу сезімі, ауыздың ұюы, көздің артқы камерасына қан құйылу, қос

көріну, көру өткірлігінің төмендеуі, көздің сезімталдығының бұзылуы, көз бен қабақтың ісінуі, көз алдының бұлдырлауы, жарық көзінің айналасындағы арайлану, қарашықтың ұлғаюы, көз ағы түсінің өзгеруі, жыныс мүшесінен қан кету, шәуһетте қанның пайда болуы, мұрынның құрғауы, мұрын қуысының шырышты қабығының ісінуі, ашуланшақтық және есту қабілетінің кенеттен төмендеуі немесе жоғалуы.
Тіркеуден кейінгі бақылау деректері бойынша тұрақсыз стенокардия (жүрек патологиясы) дамуы және кенеттен өлім оқиғалары сирек байқалды. Айта кету керек, бұл ер адамдардың көпшілігінде (бірақ бәрінде емес) осы препаратты қабылдағанға дейін де жүрек патологиясы болған. Бұл оқиғалардың силденафилді қабылдаумен тікелей байланысы бар екенін анықтау мүмкін емес.

Жағымсыз реакциялар туралы хабарлама
Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар туындаса, дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз. Осы нұсқау кез келген болуы мүмкін, оның ішінде қосымша парақта атап көрсетілмеген жағымсыз реакцияларға да қатысты болады. Сізге сондай-ақ дәрілік препараттар тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-мемлекеттер аумағында анықталған жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша ақпараттық дерекқорға жағымсыз реакциялар жөнінде тікелей мәлімдеуге болады. Жағымсыз реакциялар туралы хабарлау арқылы Сіз препараттың қауіпсіздігі туралы көбірек мәліметтер алуға көмектесесіз.
Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
010000, Астана қ., А. Иманов көш., 13
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Электрондық пошта: pdlc@dari.kz
Сайт: http://www.ndda.kz

5. Максигра Strong препаратын сақтау

Дәрілік препаратты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Қаптамасында (... дейін жарамды» деген сөздерден кейін көрсетілген жарамдылық мерзімі (сақтау мерзімі) өткеннен кейін препаратты қолданбаңыз. Жарамдылық мерзімі өтетін күн айдың соңғы күні болып табылады.

Ылғалдан және жарықтан қорғау үшін түпнұсқалық қаптамада 25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Препараттарды кәріз жүйесіне тастамаңыз (төкпеңіз). Енді керек болмайтын препараттардан қалай жоюға болатынын дәріхана қызметкерінен нақты анықтаңыз. Бұл шаралар қоршаған ортаны қорғауға мүмкіндік береді.

6. Қаптаманың ішіндегісі және қосымша мәліметтер

Максигра Strong препаратының құрамында
Әсер етуші зат силденафил болып табылады.
Максигра Strong препаратының әр 50 мг таблеткасының құрамында 70.24 мг силденафил цитраты бар (50.00 мг силденафилге баламалы).

Максигра Strong препаратының әр 100 мг таблеткасының құрамында 140.48 мг силденафил цитраты бар (100.00 мг силденафилге баламалы).
Басқа да (қосымша) заттар: маннитол, кросповидон, повидон (К30), коллоидты кремнийдің қостотығы, жүгері крахмалы, магний стеараты, натрий лаурилсульфаты, гипромеллоза (15 mPas), макрогол 6000, титанның қостотығы (Е171), тальк, индигокармин (Е132).

Максигра Strong препаратының сыртқы түрі және қаптаманың ішіндегісі
Максигра Strong, 50 мг: дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, көгілдір түсті үлбірлі қабықпен қапталған диаметрі (8.0-8.4) мм таблеткалар.
Максигра Strong, 100 мг: дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, көгілдір түсті үлбірлі қабықпен қапталған диаметрі (10.0-10.4) мм таблеткалар.

1 немесе 4 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынған. 1, 2, 3 немесе 4 пішінді қаптамадан қазақ және орыс тілдеріндегі қосымша парақпен бірге картон қорапшаға салынған.

Дәрілік препараттың босатылу санаты
Дәрілік препарат рецепт арқылы босатылу санатына жатады.

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы
Қазақстан Республикасы
«Химфарм» акционерлік қоғамы («Химфарм» АҚ)
160019, Шымкент қ., Рашидов көш., 81
Телефон нөмірі: +7 (7252) 61-01-51
Автожауапбергіш нөмірі: +7 (7252) 56-13-42
Электрондық пошта: complaints@santo.kz

Өндіруші
«ПОЛЬФАРМА» АҚ фармацевтикалық зауыты
Пельплиньска көш., 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

Препарат туралы кез келген ақпарат алу үшін, сондай-ақ шағымдар туындаған жағдайда тіркеу куәлігін ұстаушының жергілікті хабарласу керек:
Қазақстан Республикасы
«Химфарм» акционерлік қоғамы («Химфарм» АҚ)
160019, Шымкент қ., Рашидов көш., 81
Телефон нөмірі: +7 (7252) 61-01-51
Автожауапбергіш нөмірі: +7 (7252) 56-13-42
Электрондық пошта: complaints@santo.kz; phv@santo.kz

Басқа да ақпарат көздері
Аталған препарат туралы толық мәліметтер дәрілік заттардың бірыңғай тізілімінде беріледі.

ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
_____ (на 7 листах)
ПАРАҚ / ЛИСТОВ
КҮНІ / ДАТА 01.04.2026